

▼ Osenvelt (denosumab)

Pasientkort

Viktig sikkerhetsinformasjon du må kjenne til før og under behandling med denosumab (Osenvelt) ved kreftrelaterte lidelser.

▼ Dette legemiddelet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning: www.dmp.no/pasientmelding

Melding av bivirkninger:

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i dette skrivet eller i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via Direktoratet for medisinske produkter, www.dmp.no/pasientmelding

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Legen har anbefalt at du får denosumab-injeksjoner (Osenvelt) for å bidra til forebygging av komplikasjoner i skjelettet (f.eks. brudd), forårsaket av spredning til skjelettet eller benkreft.

En bivirkning som kalles osteonekrose i kjeven (ONJ, skader i ben i kjeven) er rapportert hos noen pasienter som har fått denosumab-injeksjoner ved kreftrelaterte lidelser (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer). ONJ kan også forekomme etter avsluttet behandling.

Det er viktig å unngå at du får ONJ. Det kan være en smertefull tilstand som kan være vanskelig å behandle. For å redusere risikoen for å utvikle ONJ bør du ta visse forholdsregler:

Før oppstart av behandling:

- Sjekk med legen om det anbefales kontroll hos tannlege før du starter behandlingen med denosumab (Osevelt).
- Si fra til legen/sykepleieren (helsepersonell) hvis du har problemer med munnen eller tennene.

Pasienter som:

- gjennomgår tannoperasjoner (f.eks. trekking av tenner)
- ikke får rutinemessig tannpleie
- har tannkjøtt sykdom
- røyker
- får ulike typer kreftbehandling

kan ha høyere risiko for å utvikle ONJ.

Mens behandlingen pågår:

- Du bør opprettholde god tannhygiene og få regelmessige rutinekontroller av tennene. Hvis du bruker tannproteser skal du sørge for at disse er ordentlig tilpasset.
- Hvis du mottar tannbehandling eller skal gjennomgå tannkirurgi (f.eks. trekke en tann), informer legen om tannbehandlingen og fortell tannlegen at du behandles med denosumab.
- Kontakt legen og tannlegen din umiddelbart dersom du får problemer med munnen eller tennene, som f.eks. løse tenner, smerte eller hevelser, sår som ikke gror eller avgir puss (væsker), ettersom dette kan være tegn på ONJ.

Les pakningsvedlegget som følger med legemiddelet for ytterligere informasjon.

Se oppdatert pakningsvedlegg, preparatomtale (SmPC) og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no.