

# PENTHROX®

(metoksyfluran)



## Sjekkliste for administrering

Denne sjekklisten er av vesentlig betydning for å sikre trygg og effektiv bruk av metoksyfluran, samt hensiktsmessig håndtering av viktige utvalgte risikofaktorer.

### VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON TIL HELSEPERSONELL

#### Før bruk av metoksyfluran sjekk at pasienten ikke har: Sjekk også:

- Kardiovaskulær ustabilitet
  - Overfølsomhet overfor metoksyfluran (eller andre fluorinerte anestetika)
  - Økt temperatur på grunn av et anestetikum (malign hypertermi)
  - Redusert bevissthet (også grunnet alkohol)
  - Nedsatt nyrefunksjon
- At pasienten ikke er yngre enn 18 år gammel
  - Nedsatt lunge- eller respirasjonsfunksjon
  - Nedsatt leverfunksjon
  - Siste administrasjon av metoksyfluran

**IKKE** gi metoksyfluran dersom pasienten har noen av tilstandene listet opp her eller bruker noen av legemidlene som er listet opp på baksiden.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Dette gjøres via meldeskjema som finnes på [www.relis.no/meldeskjema](http://www.relis.no/meldeskjema) og på [www.legemiddelverket.no/meldeskjema](http://www.legemiddelverket.no/meldeskjema).

## Instruer pasienten i riktig administrering av metoksyfluran.

**Påminnelse:** Les preparatomtalen før administrering og gi pasienten pakningsvedlegget. Sørg for at minste nødvendige dose administreres og at maksimum dose på 6 ml (2 x 3 ml flaske) ikke overskrides.

### Pasienten bruker ikke:

Induktorer av CYP 450-enzymene (f.eks. alkohol, isoniazid, fenobarbital eller rifampicin). Antibiotika med kjent nefrotoksisk effekt (f.eks. tetrasyklin, gentamicin, kolistin, polymyxin B eller amfotericin B).

Samtidig bruk av metoksyfluran med CNS-depressiva kan forsterke depressive effekter og pasientene bør observeres nøye.