

PASIENTVEILEDNING

▼ PLUVICTO® (lutetium (^{177}Lu) vipivotidtraktet)

Denne veiledningen er laget for å gi informasjon om lutetium (^{177}Lu) vipivotidtraktet til pasienter som har fått forskrevet dette legemiddelet eller deres omsorgspersoner.

- ▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se

www.dmp.no/pasientmelding

Kjære pasient,

Du og behandlingsteamet ditt har besluttet å starte med lutetium (^{177}Lu) vipivotidtettraksetan for å behandle din prostatakreft.

Denne veiledningen gir deg informasjon om legemiddelet samt hva du må vite før, under og etter administrasjon.

Hvis du har spørsmål som ikke besvares i denne veiledningen, må du ikke nøle med å kontakte behandlingsteamet ditt for ytterligere støtte.

1. Hva er lutetium (^{177}Lu) vipivotidtettraksetan, og hvordan virker det?

Det er en radiofarmasøytisk behandling (radioaktivt legemiddel) som brukes til å behandle voksne med fremskreden, kastrasjonsresistent prostatakreft som har spredt seg til andre deler av kroppen (metastatisk) og som allerede har blitt behandlet med andre kreftbehandlinger.

Behandlingen brukes hvis prostatakreftcellene har et protein på overflaten som kalles prostataspesifikt membranantigen (PSMA). Legemiddelet binder seg til PSMA som finnes på overflaten av prostatakreftcellene. Etter binding vil det radioaktive stoffet i legemiddelet, lutetium-177, avgi stråling som fører til at prostatakreftcellene dør.

Legen vil utføre tester for å se om PSMA er til stede på overflaten av kreftcellene. Det er større sannsynlighet for at kreften din responderer på behandling med lutetium (^{177}Lu) vipivotidtettraksetan hvis testresultatet er positivt.

Hvor lenge varer behandlingen?

Det gis omtrent hver 6. uke i opptil totalt 6 doser.

Hvordan administreres legemiddelet?

Det administreres direkte i en blodåre.


2. Hva må du vite før, under og etter administrering av legemiddelet

Bruk av lutetium (^{177}Lu) vipivotidtetraksetan innebærer eksponering for radioaktivitet.


Legen din og en nukleærmedisiner har kommet fram til at den kliniske nytten du vil ha av behandlingen med det radioaktive legemidlet, er større enn risikoen fra strålingen.

Siden dette legemidlet er radioaktivt, må du følge instruksjonene nedenfor for å minimere strålingseksponeringen for andre, med mindre du får beskjed om noe annet av legen/nukleærmedisineren din.


Behandlingsteamet ditt vil sørge for at du er godt forberedt.



Før administrering av dette legemiddelet må du drikke mye vann for å holde deg hydrert og urinere så ofte som mulig i løpet av de første timene etter administreringen.



Under administrasjonsprosedyren vil du holdes på avstand fra andre pasienter.



Etter administrering av dette legemiddelet må du drikke rikelig med vann i to dager, slik at du holder deg hydrert og urinerer så ofte som mulig for å skille det radioaktive legemidlet ut av kroppen din.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER ETTER ADMINISTRASJON AV LEGEMIDDELET

Det kan vurderes å følge generelle anbefalinger for pasienter i tillegg til nasjonale, lokale og institusjonelle prosedyrer og forskrifter.

Kontakt med andre personer, barn og/eller gravide kvinner

- Begrens nærkontakt (mindre enn 1 meter) med:
 - andre i 2 dager.
 - barn og gravide kvinner i 7 dager.
- Sov i et separat rom fra:
 - andre i 3 dager.
 - barn i 7 dager.
 - gravide kvinner i 15 dager.
- Unngå seksuell aktivitet i 7 dager
- Du må ikke gjøre en kvinne gravid og du må bruke kondom under samleie så lenge du behandles med lutetium (¹⁷⁷Lu) vipivotidtetraksetan og i 14 uker etter siste dose.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER ETTER ADMINISTRASJON AV LEGEMIDDELET (fortsettelse)

Bruk av toaletter

Ta spesielle forholdsregler for å unngå kontaminering i 2 dager etter administrering:

- Du skal alltid sitte når du går på toalettet.
- Det er svært viktig at du bruker dopapir hver gang du går på toalettet.
- Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk.
- Skyll alle tørkepapir og/eller dopapir ned i toalettet umiddelbart etter bruk.
- Kast alle servietter eller andre gjenstander som inneholder avfallsprodukter fra kroppen din, som blod, urin og avføring, i toalettet og spyl ned.
Gjenstander som ikke kan spyles ned i toalettet, for eksempel bandasjer, må legges i separate avfallsposer av plast (i henhold til "Anbefalinger for avfallshåndtering" nedenfor).
- Alt spesialmedisinsk utstyr som kan kontamineres av kroppsvæskene dine (f.eks. kateterposer, kolostomiposer, bekkener, vanndyser) skal umiddelbart tømmes i toalettet og deretter rengjøres.



SPESIELLE FORHOLDSREGLER ETTER ADMINISTRASJON AV LEGEMIDDELET (fortsettelse)

Dusjing og klesvask

- Ta en dusj hver dag i minst 7 dager etter administrering.
- Vask ditt undertøy, nattøy, sengetøy og andre klær som inneholder svette, blod eller urin atskilt fra annen klesvask, og velg et standard vaskeprogram. Du trenger ikke bruke blekemiddel, og du trenger ikke ekstra skylling.

Omsorgspersoner

I 2-3 dager etter administrasjon:

- Personer som er sengeliggende eller har nedsatt bevegelighet bør ha hjelp av en omsorgsperson. Det anbefales at omsorgspersonen bruker engangshansker når han/hun hjelper til på badet.
- Omsorgspersoner som fjerner oppkast, blod, urin eller avføring må bruke plasthansker som skal kastes i en separat plastpose (se “Anbefalinger for avfallshåndtering” nedenfor).

SPESIELLE FORHOLDSREGLER ETTER ADMINISTRASJON AV LEGEMIDDELET (fortsettelse)

Anbefalinger for avfallshåndtering

- Alle gjenstander som skal kastes skal kastes i en separat plastpose som kun skal brukes til dette formålet.
- Oppbevar plastposene adskilt fra annet husholdningsavfall og utilgjengelig for barn og dyr.
- Personal ved sykehuset vil fortelle deg hvordan og når du skal kaste disse avfallsposene.

Sykehusinnleggelse og akuttmottak

- Hvis du av en eller annen grunn trenger akutt medisinsk hjelp (nødhjelp) eller uventet blir innlagt på sykehuset i løpet av de første 7 dagene etter behandlingen, må du informere helsepersonell om navn, dato og dose på den radioaktive behandlingen.



SPESIELLE FORHOLDSREGLER ETTER ADMINISTRASJON AV LEGEMIDDELET (fortsettelse)

Andre forholdsregler

- Legen/nukleærmedisineren vil informere deg hvis du må ta andre spesielle forholdsregler etter å ha fått dette legemidlet. Kontakt legen/nukleærmedisiner din hvis du har spørsmål.



Ytterligere informasjon

- Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til Direktoratet for medisinske produkter (DMP): **www.dmp.no/pasientmelding**
- Du kan finne oppdatert pakningsvedlegg (PIL) og pasientveiledningen på **www.felleskatalogen.no**

NOTATER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTATER

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Novartis Norge AS
Postboks 4284 Nydalen, 0401 Oslo
Tlf: 23 05 20 00, www.novartis.no

