

# PASIENTKORT

## Pradaxa® drasjert granulat dabigatraneteksilat



- Omsorgspersonen eller pasienten må alltid ha med seg dette kortet
- Forsikre deg om at du bruker nyeste versjon

Januar 2021

### Kjære omsorgsperson

NO

Barnets lege har startet behandling med Pradaxa®. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye slik at du bruker Pradaxa® på en sikker måte.

Da dette pasientkortet inneholder viktig informasjon om barnets behandling, er det viktig at du eller barnet alltid har kortet med for å informere helsepersonell om at barnet bruker Pradaxa®.

**Pradaxa®**  
dabigatraneteksilat

### Informasjon om Pradaxa® til omsorgspersoner

#### Om barnets behandling

- Pradaxa® fortynner blodet. Det brukes til å behandle eksisterende blodpropper eller forhindre dannelsen av farlige blodpropper.
- Bruk alltid Pradaxa® nøyaktig slik barnets lege har forklart deg. Du må alltid administrere foreskrevet dose, aldri hoppe over en dose eller avbryte behandling med Pradaxa® uten først å rådføre deg med barnets lege.
- Informer barnets lege om alle andre legemidler barnet bruker.
- Informer barnets lege om at barnet bruker Pradaxa® før eventuelle kirurgiske inngrep/invasive prosedyrer.

- Pradaxa® drasjert granulat skal administreres med myke matvarer eller eplejuice i henhold til bruksanvisningen i pakningsvedlegget. Ikke bruk myke matvarer som inneholder melkeprodukter. Ikke administrer Pradaxa® granulat via sprøyter eller ernæringssonder.

## Når skal du søke medisinsk hjelp?

- Inntak av Pradaxa® kan øke blødningsrisikoen. Snakk med barnets lege umiddelbart hvis barnet opplever tegn og symptomer på blødning, for eksempel: hevelse, ubehag, uvanlig smerte eller hodepine, svimmelhet, blekhet, svakhet, uvanlig dannelse av blåmerker, neseblødning, blødning i tannkjøtt, uvanlig langvarig blødning fra kutt, unormal menstruasjonsblødning eller vaginal blødning, blod i urinen som kan være rosa eller brunt, rød/sort avføring, opphosting av blod, oppkast av blod eller kaffegrutlignende stoff.
- Hvis barnet faller eller skader seg, spesielt hvis han/hun slår hodet, må du umiddelbart søke legehjelp.

- 
- Du må ikke slutte å gi Pradaxa® uten først å rådføre deg med barnets lege hvis barnet opplever halsbrann, kvalme, oppkast, ubehag i magen, føler seg oppblåst eller får smerte i øvre mageregion.

## Informasjon om Pradaxa® til helsepersonell

- Pradaxa® er et oralt antikoagulantium (direkte trombinhemmer).
- Pradaxa® må kanskje seponeres før kirurgiske inngrep eller andre invasive prosedyrer.
- Ved større blødninger må Pradaxa® seponeres umiddelbart.
- Pradaxa® skilles hovedsakelig ut gjennom nyrene. Adekvat diurese må opprettholdes. Pradaxa® kan fjernes ved dialyse. Se preparatomtalen.

Fyll ut denne delen, eller be barnets lege om å gjøre det.

### Pasientinformasjon

---

Pasientens navn

---

Fødselsdato

---

Indikasjon for antikoagulasjon

---

Dose av Pradaxa®