

Pasientkort

NO DK IS

Remsima[®]
infliksimab

Vis dette kortet til
enhver lege som
er involvert
i din behandling.

Pasientnavn:

.....
.....

Legens navn:

.....
.....

Legens telefonnummer:

.....
.....

Dato for oppstart av
Remsimabehandling:

.....
.....

Nåværende administrering:

.....
.....

.....
.....

Lag deg også en liste over alle
andre legemidler som du
bruker og ta denne med til
ethvert besøk hos lege.

Liste over andre legemidler:

.....
.....
.....
.....

Liste over allergier:

.....
.....
.....
.....

 HEALTHCARE
CELLTRION™
LM165907-PA004

Be legen din notere type og
dato for den/de siste
undersøkelse(n)e for
tuberkulose (TB) under:

Test:

.....
.....

Dato:

.....
.....

Resultat:

.....
.....

Det er viktig at du og legen
din noterer ned
handelsnavnet og batchnum-
meret til legemidlet som blir
gitt til deg.

Handelsnavn:

.....
.....

Batchnummer:

.....
.....

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med Remsima.

Når et nytt kort tas i bruk, behold dette kortet som referanse i 4 måneder etter din siste dose med Remsima.

Vennligst les pakkingsvedlegget til Remsima nøye før du starter å bruke dette legemidlet.

Ha dette kortet med deg i 4 måneder etter din siste dose med Remsima eller ved graviditet, i minst 12 måneder etter fødselen av barnet ditt. Bivirkninger kan oppstå i lang tid etter din siste dose.

| Infeksjoner |

Før Remsimabehandling

- Informer legen din dersom du har en infeksjon selv om den er mindre alvorlig
- Det er veldig viktig at du informerer legen din dersom du noen gang har hatt tuberkulose (TB), eller hvis du har vært i nær kontakt med noen som har hatt TB. Legen din vil teste deg for å se om du har TB. Be legen din notere type og dato for din(e) siste undersøkelse(r) for TB på kortet
- Informer legen din dersom du har hepatitt B eller hvis du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset.

Under Remsimabehandling

- Informer legen din umiddelbart dersom du har tegn på en infeksjon. Tegnene inkluderer feber, tretthetsfølelse, (vedvarende) hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diaré, sår, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer.

| Graviditet, amming og vaksinerings |

- Hvis du fikk Remsima da du var gravid eller hvis du ammer er det viktig at du informerer legen til barnet ditt om dette før barnet ditt får noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få en «levende vaksine», slik som BCG (brukes til å forebygge tuberkulose) før 12 måneder etter fødselen eller så lenge du ammer, med mindre ditt barns lege anbefaler noe annet.