

Vis dette kortet til helsepersonell som behandler deg
– for eksempel tannlegen din eller på legevakten.

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking.
Du kan bidra ved å kontakte AbbVie på telefon
+47 67 81 80 00 for å melde enhver mistenkt
bivirkning.

AbbVie AS - Martin Linges vei 25 - Postboks 1 - 1330 Fornebu - Tlf: 67 81 80 00

NO-RNQ-200002v1.0.

Ditt navn:

Legens navn – som forskrev RINVOQ®:

Legens telefonnummer:

Datoen du startet på RINVOQ®:



NO-RNQ-200002v1.0. Akseptert av Statens legemiddelverk
dato 21.02.2020. www.rinvoq.eu www.felleskatalogen.no

abbvie

Pasientkort

Ha alltid dette kortet med deg

**Sikkerhetsinformasjon – ▼RINVOQ®
(upadacitinib) for pasienter**

- Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på – før og under behandling med RINVOQ®.
- Les pakningsvedlegget for mer informasjon.

NO-RNQ-200002v1.0.

Infeksjonsrisiko

RINVOQ[®] kan forverre en eksisterende infeksjon eller øke sjansen for at du får en ny infeksjon – for eksempel tuberkulose, helvetesild eller virushepatitt.

Snakk med legen din umiddelbart hvis du oppdager tegn på infeksjon, slik som:

- Feber, svette, frysninger, vekttap eller hoste som ikke forsvinner – dette kan være tegn på tuberkulose
- Smertefullt hudutslett med blemmer - dette kan være tegn på helvetesild
- Føler deg trøtt eller kortpustet – dette kan være tegn på lungebetennelse

Vaksiner – brukt til å forebygge infeksjoner

Levende vaksiner (for eksempel influensavaksine gitt som nesenspray) skal ikke gis under behandling eller rett før oppstart med RINVOQ[®].

Snakk med legen din før du får vaksine – legen vet hvilke vaksiner som du ikke skal ta før eller under behandling med RINVOQ[®].

Kolesterol

Legen din vil sjekke fettinnholdet i blodet (kolesterol) mens du tar RINVOQ[®] – dette er for å vurdere om du trenger å starte på kolesterolsenkende legemidler.

Prevensjon, graviditet og amming

RINVOQ[®] skal ikke brukes under graviditet.

- Bruk sikker prevensjon mens du tar RINVOQ[®] – og i 4 uker etter den siste dosen. Snakk med legen din om sikker prevensjon.
- Snakk med legen din umiddelbart dersom du ønsker å bli gravid eller hvis du blir gravid.
- RINVOQ[®] skal ikke brukes under amming.

Blodpropp i vener (dyp venetrombose) eller lunger (lungeemboli)

Snakk med legen din umiddelbart dersom du får tegn på blodpropp i vener eller lungeemboli, slik som smerter og hevelse i leggen eller brystmerter.