


VARSELSKORT FOR HELSEPERSONELL FOR NHL/CLL VEDRØRENDE KORREKT ADMINISTRASJONSMÅTE FOR ▼RIXATHON® (RITUKSIMAB)

RIXATHON® SKAL KUN ADMINISTRERES INTRAVENØST – IKKE TIL SUBKUTAN BRUK

Det finnes andre rituksimab-preparater til subkutan bruk som er tilgjengelige på markedet.



TIL INTRAVENØS INFUSJON

Rixathon® 100 mg/10 ml konsentrat
til infusjonsvæske, oppløsning

Rixathon® 500 mg/50 ml konsentrat
til infusjonsvæske, oppløsning

**Til intravenøs bruk i alle godkjente
indikasjoner med Rixathon®**

Fortynnes med 0,9 % NaCl eller 5 % glukose
og administreres via intravenøs infusjon



Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til sitt regionale legemiddelinformasjonscenter (RELIS): www.relis.no/meldeskjema eller til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Godkjent av Statens legemiddelverk, juli 2017.