



Påminnelsekort for omsorgspersoner

Rybrila 160 mikrogram/ml mikstur, oppløsning (glykopyrroniumbromid)

Slik håndterer du vanlige bivirkninger

Det finnes forskjellige styrker av flytende glykopyrroniumbromid tilgjengelig i Norge. Undersøk nøye produktets merking for å sikre at du har fått utlevert Rybrila til ditt barn.

Ditt barn eller ungdom har fått foreskrevet Rybrila for behandling av overdreven produksjon av spytt (sialoré). Rybrila anbefales ikke til barn yngre enn 3 år.

Bivirkninger tilknyttet bruken av Rybrila (et antikolinergt legemiddel) kan være doseavhengig og vanskelig å bedømme hos et funksjonshemmet barn. Ditt barns lege vil snakke med deg om vanlige bivirkninger som kan oppstå og hvordan man skal håndtere dem.

Det er viktig å sørge for at en nøyaktig dose gis hver gang, for å forhindre skadelige virkninger av Rybrila som har blitt sett ved doseringsfeil eller overdose.

Viktig informasjon om hvordan Rybrila gis:

- Gi alltid Rybrila akkurat som legen har instruert. Du må ikke øke dosen uten legens tillatelse. Sjekk med legen din hvis du er usikker.
- Gi Rybrila minst én time før eller to timer etter måltider. Hvis barnets spesifikke behov krever samtidig administrasjon med mat er, er det viktig å fortsette å gi Rybrila med mat. Ikke gi sammen med svært fettrik mat.
- Du må måle opp og kontrollere at dosen blir riktig med målesprøyten som følger med i pakken. Dobbeltsjekk alltid at riktig volum av Rybrila er trukket opp i sprøyten. Instruksjoner om hvordan man bruker sprøyten finnes i pakningsvedlegget.
- Administrasjonstabell en på slutten av dette kortet skal utfylles av forskrivende lege ved oppstart av behandling, og ved hver doseendring. Hensikten er å minne om riktig dose som skal gis til barnet.

Doseringstabell:

Pasientnavn:

Fødselsdato:

Legens navn:

Legens kontaktinformasjon:

Dose foreskrevet (skal fylles ut av lege)

Nr	Dose (ml)	Startdato (ddmmåå)	Sluttdato (ddmmåå)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			



Slik håndterer du viktige bivirkninger:

- Hvis noen av følgende bivirkninger oppstår må du slutte å gi Rybrila til barnet og oppsøke umiddelbar medisinsk veiledning:
 - Vanskeligheter med avføring (forstoppelse)
 - Vanskeligheter med urinavgang eller vanskeligheter med å få tømt blæren fullstendig (manglende urinavgang)
 - Lungebetennelse
 - Allergisk reaksjon (utslett, kløe, rødt og hovent kløende utslett (elveblest), pustebesvær eller svelgebesvær, svimmelhet)
- Bivirkninger kan noen ganger være vanskelig å gjenkjenne hos pasienter med nevrologiske problemer som ikke kan uttrykke hva de føler på en tilstrekkelig måte. Hvis du mener at en plagsom bivirkning oppstår etter økning av en dose, må du senke dosen til den forrige, og kontakte behandlende lege.
- Unngå å utsette pasienten for varmt eller svært varmt vær, på grunn av fare for overoppheting og heteslag. Sjekk med barnets lege i varme perioder eller hvis barnet har feber, for å se om dosen med Rybrila skal reduseres.
- Siden redusert spyttproduksjon kan føre til økt risiko for karies er daglig tannhygiene og jevnlig tannkontroller viktig.
- Sjekk barnets puls med jevne mellomrom. Rådfør deg med barnets lege hvis hjerterytmen er svært langsom eller svært rask
- Du må se etter endringer i barnets velvære eller adferd, og fortelle det til legen.

Tilleggsinformasjon

Oppsøk umiddelbart medisinsk veiledning hvis barnet gis for mye Rybrila, selv om barnet ser ut til å ha det bra.

Fortell barnets lege hvis barnet tar, nylig har tatt eller kanskje skal ta andre medisiner.

Rådfør deg med barnets lege minst hver 3. måned for å sikre at Rybrila fortsatt er riktig for barnet.

Ytterligere informasjon om Rybrila finner du i pakningsvedlegget.

Se doseadministrasjonstabellen ovenfor for å finne riktig dose for ditt barn.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege, apotek eller sykepleier ved mistanke om bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter: www.dmg.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Bivirkninger kan også meldes til CampusPharma via email pv@campuspharma.se.