

Silarosa[®]

Lisdeksamfetamindimesilat

10 mg/ml mikstur, oppløsning

Veiledning for omsorgspersoner - peroral administrering

Denne brosjyren viser hvordan Silarosa administreres riktig til barn og ungdom.




Slik gir du Silarosa



1

Vask alltid hendene før du gir et legemiddel.



2

Les pakningsvedlegget og kontroller foreskrevet dose.



3

Trykk barnesikringen ned og vri korken mot klokken.



Første gangs bruk

Sett adapteren bestemt inn i flaskehalsen mens du holder adapterens flate overflate vendt opp og trykker på den.

***DOSEN SKAL MÅLES I
MILLILITER (mL)**

Se tabell på baksiden

✓ Riktig: mL

× Ikke bruk: mg



4

Skyv stempelet helt ned for å fjerne luft. Fest sprøyten til adapteren med en lett vridning til den sitter godt.



5

Vend flasken opp ned og trekk stempelet ned til litt over foreskrevet **mL-marke-ring**.* Skyv deretter stempelet opp til riktig markering for å fjerne luftbobler.



6

Vend flasken rett vei og ta sprøyten forsiktig ut av adapteren.



7

Tøm sprøyten direkte i munnen, eller bland dosen i vann, juice eller brus (ikke te, da dette kan påvirke effekten). Drikk umiddelbart.



8

Sett lokket tilbake på flasken. Skyll og vask sprøyten med kaldt eller varmt vann, og la den tørke helt før neste bruk.

**Forskrevet dose
(styrke i mg)**

**Mengde som skal trekkes opp
(volum i mL)**

10 mg	1,0 mL
20 mg	2,0 mL
30 mg	3,0 mL
40 mg	4,0 mL
50 mg	5,0 mL
60 mg	6,0 mL
70 mg	7,0 mL

- **Følg dosen legen har foreskrevet**
- **Mål alltid dosen i milliliter (mL)**
- **Silarosa kan tas med eller uten mat**

Les alltid pakningsvedlegget nøye før bruk. For fullstendig og oppdatert informasjon om legemidlet, inkludert advarsler og mulige bivirkninger, se pakningsvedlegget eller besøk www.felleskatalogen.no