

PASIENTKORT



Viktig sikkerhetsinformasjon til pasienter som bruker Soliris®

Soliris kan nedsette immunsystemets evne til å bekjempe infeksjoner, **særlig meningokokkinfeksjon (hjernehinnebetennelse), som krever øyeblikkelig legehjelp**. Dersom du får noen av følgende symptomer, skal du umiddelbart varsle legen din eller oppsøke legevakt, helst en legevakt tilknyttet sykehus:

- hodepine med kvalme eller oppkast
- hodepine med stiv nakke eller rygg
- feber
- utslett
- forvirring
- muskelsmerter sammen med influensalignende symptomer
- øyne som er overfølsomme overfor lys



Oppsøk legevakt umiddelbart hvis du får noen av disse tegnene eller symptomene og vis dette pasientkortet.

Selv om du slutter å bruke Soliris, må du ha med deg dette kortet i 3 måneder etter din siste dose med Soliris. Risikoen for meningokokkinfeksjon (hjernehinnebetennelse) kan fortsette i flere uker etter den siste dosen med Soliris.

PASIENTKORT



Informasjon til behandlende lege



Denne pasienten behandles med Soliris (eculizumab), som øker pasientens mottakelighet overfor meningokokkinfeksjon (*Neisseria meningitides*) eller andre generelle infeksjoner.

- Meningokokkinfeksjoner kan raskt bli livstruende eller fatale dersom de ikke gjenkjennes og behandles tidlig
- **Vurder straks om infeksjon kan mistenkes og behandle med passende antibiotika hvis nødvendig**
- Kontakt forskrivende lege (under) så snart som mulig

For ytterligere informasjon om Soliris, se den fullstendige preparatomtalen eller send e-post til: medinfo.EMEA@alexion.com eller ring +46 8 506 30 762.



Pasienter som behandles med Soliris skal alltid ha med seg dette pasientkortet. Vis dette kortet til alle leger som behandler deg.

Pasientens navn _____

Sykehuset der behandlingen foregår _____

Legens navn _____

Telefonnummer _____

Vaksinasjonsdato _____

