Sikkerhetsinformasjon

Etter krav fra Direktoratet for medisinske produkter

SPRAVATO® – Sjekkliste for helsepersonell

Ved hver behandlingsrunde skal pasientene ha tilsyn av helsepersonell under og etter administrasjon av Spravato (esketamin) nesespray inntil de er stabile, basert på klinisk vurdering

Behandlende lege er ansvarlig for å fastslå når pasienten anses som klinisk stabil, basert på denne sjekklisten og sin kliniske vurdering, og derfor ikke lenger trenger å bli overvåket av helsepersonell.

Klinisk vurdering

1. **Forbigående dissosiative tilstander og persepsjonsforstyrrelser (dissosiasjon):** Har du sjekket at pasienten ikke har tegn på dissosiasjon eller persepsjonsforandringer som kan påvirke funksjonsevnen? ☐

2. **Bevissthetsforstyrrelser (sedasjon):** Har du sjekket at pasienten er helt våken og responderer på stimuli (dvs. ikke har sedasjon)? ☐

3. **Blodtrykksøkning:** Er pasientens blodtrykksverdier på akseptabelt nivå? ☐

4. **Andre bivirkninger:** Har eventuelle andre bivirkninger opphørt? ☐

Pasienten

5. Hvis aktuelt, har du informert pasienten om at vedkommende ikke skal kjøre eller bruke maskiner før neste dag, etter en god natts søvn? ☐

6. Hvis aktuelt, har pasienten planlagt hjemreise med offentlig transportmiddel eller fått noen til å kjøre seg hjem? ☐

Slutten av overvåkningsperiode

7. Anser du, som behandlende lege og basert på din kliniske vurdering, at pasienten er klinisk stabil og ikke lenger trenger å bli overvåket av helsepersonell? ☐

ADVARSEL: Hvis ikke pasientene er innlagt på sykehus, instruer dem om å ikke utøve potensielt risikofylte aktiviteter, slik som å føre et kjøretøy eller bruke maskiner, før neste dag, etter en god natts søvn.

Hva som skal gjøres i en akuttsituasjon

Hvis pasienten ikke responderer på risting, roping eller smertefulle stimuli

Puster pasienten?

- ÅPNE luftveiene
- SE om brystkassen hever og senker seg
- LYTT etter pustelyder
- SJEKK pustefrekvensen

Pasienten puster

- Legg pasienten i sideleie på venstre side (stabilt sideleie)
- Iversett akuttresponsplanen (i henhold til lokale retningslinjer)
- Overvåk pasienten for eventuelle endringer

Pasienten puster IKKE eller bare gisper

Hvis du er alene, ring etter eller få tak i hjelp

- Legg pasienten i ryggleie
- Iverksett akuttresponsplanen (i henhold til lokale retningslinjer)
- Følg retningslinjer for livreddende førstehjelp/foreta hjerte-lungeredning (CPR)

CP-221250 JC-190362-3_No 04/2024