

## Ny pasient

### Mann

Start med *Thalidomide Celgene*<sup>TM</sup>. Kondom må brukes ved samleie med gravide kvinner og fertile kvinner under hele behandlingen med thalidomid, i perioder med avbrutt dosering og i 1 uke etter at behandlingen er avsluttet, hvis partneren ikke bruker prevensjon (dette gjelder også for menn som har gjennomgått vasektomi).

### Kvinne

#### Kriterier for infertile kvinner

- Alder  $\geq 50$  år og naturlig amenoré i  $\geq 1$  år\*
- Prematur ovariesvikt bekreftet av en spesialist i gynekologi
- Tidligere bilateral salpingo-ooforektomi eller hysterektomi
- Genotyp XY, Turners syndrom, uterusagenesi

\* Amenoré etter kreftbehandling utelukker ikke fertilitet

Start med *Thalidomide Celgene*. Ingen krav til prevensjonsmetode og graviditetstest

#### Kriterier for fertile kvinner

Fertile kvinner må bruke en effektiv prevensjonsmetode i 4 uker før behandling, under behandling og i 4 uker etter behandling med *Thalidomide Celgene*, selv om doseringen avbrytes, med mindre pasienten forplikter seg til absolutt og kontinuerlig avholdenhet, bekreftet på månedlig basis. Følgende kan anses å være eksempler på egnede prevensjonsmetoder:

- Implantat
- Livmorinnlegg som avgir levonorgestrel
- Medroksyprogesteronacetat depot
- Eggledersterilisering
- Samleie kun med vasektomert mannlig partner; vasektomi må være bekreftet ved to negative sædanalyser
- P-piller med kun ovulasjonshemmende progesteron (dvs. desogestrel)

Graviditetstest i samsvar med lokal praksis etter 4 uker med en effektiv prevensjonsmetode (selv ved absolutt avholdenhet)

#### Negativ

Start med *Thalidomide Celgene*. Graviditetstest med 4 ukers mellomrom (selv ved absolutt avholdenhet)

#### Positiv

START IKKE BEHANDLINGEN. Rådspør helsepersonell med egnet utdannelse for prevensjonsrådgivning