

Pasientkort

Sikkerhetsinformasjon til pasienter Vennligst husk alltid å ha dette kortet med deg.

Viktig sikkerhetsinformasjon til helsepersonell

Tolvaptan Teva B.V. kan forårsake leverskade. Testing av leverfunksjon skal utføres regelmessig (månedlig i de første 18 månedene, deretter hver 3. måned). Ved tegn på leverskade eller unormal økning av ALAT og ASAT skal behandling med Jinarc umiddelbart avsluttes.

Tolvaptan Teva B.V blokkerer virkningen av vasopressin i nyrene, og kan forårsake stort urinvolum og kraftig dehydrering. Symptomer på dehydrering kan omfatte økt tørste, munntørrehet, tretthet, lavere urinproduksjon, hodepine, tørr hud, kløe, økt hjerterytme og forvirring.

Viktig sikkerhetsinformasjon for pasienter

Tolvaptan Teva B.V kan påvirke måten leveren din fungerer på

Rådfør deg med lege hvis du opplever symptomer på tretthet, nedsatt appetitt, magesmerter, feber, mørk urin, gulfarge i hud eller øyne (gulsott), kraftig dehydrering, kvalme, oppkast, kløe eller ledd- og muskelsmerter med feber.

Tolvaptan Teva B.V kan forårsake kraftig dehydrering

Drink rikelig væske for å unngå dehydrering. Rådfør deg med lege hvis du ikke får i deg nok væske via munnen.

Besøk www.felleskatalogen.no for mer informasjon.

Pasientens navn: _____

Dato for første foreskrivning af Tolvaptan Teva B.V. _____

Legens navn: _____

Sykehusets navn: _____

Sykehusets telefonnummer: _____