

Informasjon om dosering i forbindelse med introduksjon av ny insulinpenn DoubleStar™

TOUJEO® (INSULIN GLARGIN 300 ENHETER/ML injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn)

Toujeo® 300 enheter/ml SoloStar®, én enhet pr klikk
Toujeo® 300 enheter/ml DoubleStar™, to enheter pr klikk

VEILEDER FOR PASIENTER OG/ELLER OMSORGSPERSONER FOR Å UNNGÅ DOSERINGSFEIL:

- Før du begynner å bruke Toujeo®, må du ha fått opplæring av en helsearbeider, og du må lese og forstå pakningsvedlegget.

Viktig sikkerhetsinformasjon de første ukene du bruker Toujeo®

- Omstilling fra en insulinbehandling til en annen skal kun gjøres når det er forskrevet av lege. Den anbefalte dosen skal alltid etterleves.
- Blodsukkeret må overvåkes tett under omstillingen og i ukene etterpå.
- Insulin glargin 300 enheter/ml (Toujeo®) er **ikke byttbar** med andre preparater med insulin glargin 100 enheter/ml **uten dosejustering**.
- Insulin glargin 300 enheter/ml er tilgjengelig i to forskjellige penner:



Dosetrinnene av Toujeo® SoloStar® er én enhet pr trinn.

Dosetrinnene av Toujeo® DoubleStar™ er 2 enheter pr trinn.

Minste dose med den nye Toujeo DoubleStar er 2 enheter.

Dosen som gis er den som vises i doseringsvinduet.

Vennligst rådfør deg med helsepersonell for ytterligere informasjon.

Les instruksjonene og pasientinformasjonen som følger pakningsvedlegget nøye før bruk. Pakningsvedlegget kan søkes opp på www.Felleskatalogen.no

Hvis du opplever bivirkninger, snakk med din lege eller farmasøyt. Det gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Du kan også rapportere bivirkninger til Sanofi via telefon 46 91 80 01 (kl 10-14) eller via e-post medinfo-norge@sanofi.com