

4

- Vis dette kortet til alle leger som behandler deg, ikke bare nevrologen.
- Se pakningsvedlegget for TYSABRI for mer informasjon.
- Behold dette kortet i 6 måneder etter siste dose med TYSABRI, fordi bivirkninger kan oppstå også etter at du har avsluttet behandlingen med TYSABRI.
- Vis dette kortet til din partner eller dine omsorgspersoner. Det kan hende de ser symptomer på PML som du selv ikke legger merke til, f.eks. endringer i humør eller atferd, hukommelsessvikt eller vanskeligheter med å snakke og kommunisere. Du bør være oppmerksom på symptomer som kan oppstå i opptil 6 måneder etter at behandlingen med TYSABRI er avsluttet.

Pasientens navn: _____

Legens navn: _____

Legens telefonnummer: _____

Dato for oppstart av TYSABRI: _____



05/2016

TYSABRI
(natalizumab)

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

TYSABRI
(natalizumab)

Informasjonskort til pasienten

TYSABRI® (natalizumab)

pasientkort

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på **før** du får behandling med TYSABRI, **under** behandlingen og **etter** at behandlingen er **avsluttet**.

Før behandling med TYSABRI

- Du skal ikke behandles med TYSABRI dersom du har alvorlige problemer med immunforsvaret.
- Du skal ikke få langvarig behandling med andre medisiner for multippel sklerose mens du får TYSABRI.

1

Under behandling med TYSABRI

Det har forekommet tilfeller av en sjelden hjerneinfeksjon som kalles PML (progressiv multifokal leukoencefalopati) hos pasienter som har fått TYSABRI. PML fører vanligvis til alvorlig uførhet eller død. Risiko for PML ser ut til å øke jo lenger du får behandling, særlig hvis du har fått behandling i mer enn 2 år.

Symptomene på PML kan ligne et MS-attakk. Det er derfor veldig viktig at du kontakter legen din så snart som mulig hvis du tror at din MS blir verre eller hvis du legger merke til nye symptomer mens du får behandling med TYSABRI og i opptil 6 måneder etter at behandlingen er avsluttet.

PML-symptomer oppstår gjerne langsommere (i løpet av noen dager eller uker) enn symptomene som er forbundet med et MS-attakk, og de kan ligne MS-symptomene.

2

Tegn kan være:

- endring i mental tilstand og konsentrasjonsevne
- endringer i atferd
- svekkelse i den ene siden av kroppen
- synsproblemer
- nye neurologiske symptomer som er uvanlige for deg.

Hvis det oppstår PML må behandlingen avbrytes og TYSABRI fjernes fra blodet ved såkalt plasmautskifting. Hos pasienter med PML oppstår ofte en alvorlig betennelsesreaksjon som kalles IRIS. IRIS kan oppstå fra noen dager til et par uker etter at TYSABRI er fjernet fra blodet. IRIS kan føre til ulike symptomer, inkludert forverring av hjernefunksjon (nevrologisk funksjon).

Andre alvorlige infeksjoner kan oppstå med TYSABRI. Kontakt lege så snart som mulig dersom du tror du har en alvorlig og vedvarende infeksjon, for eksempel vedvarende feber.

3