

Pasientkort

– advarsel om graviditet

Velsipity
(etrasimod)



Melding av bivirkninger:

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP

www.dmp.no/pasientmelding

Velsipity kan skade fosteret hvis det brukes under graviditet. Det er en potensiell risiko for spontanabort og misdannelser hos fosteret.

Du skal ikke bruke Velsipity dersom du er gravid eller ammer, planlegger å bli gravid eller dersom du kan bli gravid og ikke bruker sikker prevensjon. Si fra til lege eller sykepleier umiddelbart dersom noe av dette gjelder deg.

Viktig informasjon:

- Du må ha en negativ graviditetstest før oppstart av behandling, og du må også ta jevnlige graviditetstester under behandlingen.
- Du må bruke sikker prevensjon mens du tar Velsipity, og i minst 14 dager etter at du har avsluttet behandlingen. Legen vil gi råd om riktig prevensjon for deg.

Si fra til legen umiddelbart dersom du likevel blir gravid under behandling med Velsipity, eller innenfor 14 dager etter at behandlingen ble avsluttet.

Behandling med Velsipity skal avsluttes ved graviditet. Legen vil snakke med deg om risiko for fosterskade og kan gjøre flere undersøkelser, bl.a. ultralyd.

Ha dette kortet med deg og vis det til helsepersonell som er involvert i din medisinske behandling.

- Dersom du slutter å bruke Velsipity må du ha dette kortet med deg i minst 2 måneder etter at du har tatt siste dose av Velsipity.

Se pakningsvedlegget i pakningen, eller se www.felleskatalogen.no for mer informasjon

Annen informasjon (vennligst fyll ut):

Pasientens navn:

Legens navn:

Legens telefon:

Dette pasientkortet er også tilgjengelig på www.felleskatalogen.no

Pfizer AS | Postboks 3, 1324 Lysaker
Tlf: 67 52 61 00 | www.pfizer.no