



# Din behandling med XALKORI<sup>®</sup> (krizotinib) - viktig sikkerhetsinformasjon

Dette heftet er beregnet på pasienter som skal få behandling med XALKORI

## Innhold

Introduksjon	1
Hva er ALK-positiv og ROS1-positiv NSCLC ?	2
Hva er mulige bivirkninger av XALKORI?	2
Hvordan håndtere bivirkninger av XALKORI?	3
Sikkerhetsinformasjon	5
Kilder til hjelp og informasjon	5
XALKORI pasientkort	6

## Introduksjon

Legen din har skrevet ut XALKORI kapsler til behandling av din lungekreft. Dette heftet inneholder informasjon om hva man skal følge med på når man står på behandling og hvordan man håndterer eller lindrer eventuelle bivirkninger.

Vær oppmerksom på at informasjonen i dette heftet ikke erstatter råd du får av lege, sykepleier eller farmasøyt. Rådfør deg alltid med helsepersonell som er involvert i din behandling hvis du er usikker eller har spørsmål.

Du bør også lese pakningsvedlegget som følger med i hver pakning med XALKORI. Det vil bli fortløpende oppdatert for å inkludere den nyeste tilgjengelige kunnskapen om XALKORI.

## Hva er ALK-positiv og ROS1-positiv ikke-småcellet lungekreft (NSCLC)?

Hos omtrent 3-5 % av pasienter med NSCLC skyldes sykdommen en spesiell endring eller defekt i et gen som kalles anaplastisk lymfomkinase (ALK), mens 1-2 % av pasienter med NSCLC har en endring eller defekt i et gen som kalles ROS1. Disse endringene eller defektene forekommer sjelden sammen.

## Hva er mulige bivirkninger av XALKORI?

Som for alle legemidler, kan det hos enkelte pasienter forekomme bivirkninger når de tar XALKORI. Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, eller andre symptomer, mens du bruker XALKORI.

***Bivirkninger som kan være alvorlige (se beskrivelse under for mer detaljert informasjon):***

- Leversvikt
- Lungebetennelse
- Reduksjon i antall hvite blodceller (inkludert nøytrofile)
- Svimmelhet, besvimelse eller brystmerter (kan være tegn på unormal hjerterytme)
- Delvis eller fullstendig synstap på ett eller begge øyne

### **Melding av bivirkninger**

Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt her eller i pakningsvedlegget. Pakningsvedlegget finner du i hver XALKORI-pakning. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: [www.legemiddelverket.no/pasientmelding](http://www.legemiddelverket.no/pasientmelding). Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

### **Synsforstyrrelser**

Du vil kunne oppleve synsforstyrrelser – dette inntreffer vanligvis innen én uke etter behandlingsstart. Disse forstyrrelsene kan være:

- Lysglimt
- Uklart syn
- Dobbeltsyn

Omtrent 6 av 10 personer opplever disse bivirkningene.

Du må være ekstra forsiktig når du kjører eller bruker maskiner. Det kan hende at du må slutte med dette dersom du føler at synsforstyrrelsene hindrer deg i å utføre disse aktivitetene på en sikker måte.

Synsforstyrrelsene kan avta over tid. Du bør informere legen din hvis du opplever synsforstyrrelser som ikke gir seg, eller som forverres over tid. Legen din vil eventuelt henvise deg til en øyelege for synsundersøkelse.

Du kan også oppleve delvis eller fullstendig synstap på ett eller begge øyne.

**Si fra til legen med én gang dersom du opplever synstap eller synsendringer, f.eks. at du har problemer med å se på det ene øyet eller begge øynene. Legen kan avslutte behandlingen med XALKORI og henvise deg til øyelege.**

## **Hvordan håndtere bivirkninger av XALKORI?**

### ***Svimmelhet, besvimelse, brystmerter og uregelmessige hjerteslag***

Si fra til legen med en gang dersom du opplever disse symptomene, da dette kan være tegn på endringer i hjertets elektriske aktivitet (som vist på elektrokardiogram/EKG), eller på endringer i hjerterytmen. Dersom du allerede har en hjertesykdom vil legen din overvåke hjertefunksjonen din nøye og justere dosen av XALKORI hvis det er nødvendig. Legen kan ta EKG for å sjekke at du ikke har problemer med hjertet under behandling med XALKORI.

### ***Nedsatt hjerterytme***

XALKORI kan føre til nedsatt hjerterytme. Legen din vil overvåke hjertefunksjonen og justere dosen av XALKORI.

### ***Redusert antall hvite blodceller (inkludert nøytrofile)***

Snakk med legen din umiddelbart dersom du opplever feber eller infeksjon. Legen kan ta blodprøver og dersom resultatene er unormale kan legen velge å redusere dosen av XALKORI.

### ***Hjertesvikt***

Si i fra til legen din umiddelbart dersom du opplever tegn eller symptomer på hjertesvikt. Disse symptomene kan være kortpustethet, hevelser i armer, ben, hender, føtter eller ansikt, eller rask vektøkning. Legen din kan velge å midlertidig stoppe behandlingen med XALKORI, redusere XALKORI-dosen eller avslutte behandlingen helt.

### ***Hull (perforasjon) i mage eller tarm***

Snakk med legen din umiddelbart dersom du opplever sterke mage- eller buksmerter, feber, frysninger, kortpustethet, rask hjerterytme eller endringer i avføringsmønster. Disse symptomene kan være tegn på hull (perforasjon) i mage eller tarm.

### ***Leverskade***

Det vil bli tatt regelmessige blodprøver under behandling med XALKORI. Dette gjøres for å overvåke funksjonen av ulike organer, inklusiv leveren.

**!** Si fra til legen med én gang:

- dersom du føler deg mer trett enn vanlig
- hvis huden eller det hvite i øynene blir gulfarget eller urinen blir mørk/brun (tefarget)
- dersom du blir kvalm, kaster opp eller får nedsatt appetitt
- dersom du får smerter i høyre side av magen, får kløe eller får flere blåmerker enn vanlig

Dette kan være tegn på at leveren din påvirkes av behandlingen. Legen kan ta blodprøver for å undersøke leverfunksjonen din, og dersom resultatene er unormale kan legen bestemme at dosen av XALKORI skal reduseres, eller at behandlingen skal stoppes.

Si fra til legen umiddelbart dersom du opplever noen av de ovennevnte symptomene. Ikke vent til din neste timeavtale.

### ***Pusteproblemer***

En mulig bivirkning av XALKORI er lungebetennelse.

**!** Kontakt legen umiddelbart dersom du, etter at du har startet behandling med XALKORI, opplever nye plager, slik som pusteproblemer, hoste eller feber, eller dersom noen av dine plager blir forverret.

### ***Svimmelhet***

Enkelte personer som bruker XALKORI kan oppleve tilfeller av svimmelhet under behandlingen.

**!** Dette vil vanligvis ikke være alvorlig, men du bør si fra til legen din.

### ***Tretthet***

Under behandling med XALKORI kan du føle deg svak og bli fortere trett enn vanlig. Slik tretthet, ofte kalt fatigue, kan være en bivirkning av XALKORI.

Dette kan være til hjelp for deg:

- Vær aktiv og engasjer deg i sosiale aktiviteter, gjerne utendørs
- Prøv å trene litt, i den grad du orker det, og på en måte som er behagelig for deg
- Ta hyppige, korte pauser
- Slapp av, lytt til musikk og les en god bok

- Ikke nøl med å spørre familie, venner eller naboer om hjelp til daglige oppgaver

## Sikkerhetsinformasjon

### *Kjøring og bruk av maskiner*

Siden XALKORI kan forårsake bivirkninger som synsforstyrrelser, svimmelhet og tretthet, må du være spesielt forsiktig med kjøring og bruk av maskiner. Snakk med legen din om bekymringer du har.

## Kilder til hjelp og informasjon

Kontaktinformasjon til pasientorganisasjoner og andre nyttige nettsider:

**Den norske kreftforening:** <https://kreftforeningen.no/>

**Norsk lungecancergruppe:** <http://nlcg.no/>

**Kreftlinjen:** [kreftlinjen@kreftforeningen.no](mailto:kreftlinjen@kreftforeningen.no)  
eller telefon **800 57 338**

**Lungekreftforeningen:** <http://www.lungekreftforeningen.no/>

## XALKORI pasientkort

Fyll ut dette kortet, og vis det til andre leger, sykepleiere eller farmasøyter du rådfører deg med utenom de som behandler deg til vanlig.

Pasientens navn: .....

Legens navn: .....

Legens telefonnummer: .....

Oppstartsdato for behandling med XALKORI:  
.....

**Informér lege, sykepleier eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert naturlegemidler og reseptfrie legemidler.**