


# XYREM®

## Hvordan ta Xyrem®

Esken med Xyrem® (natriumoksybat) inneholder én flaske med Xyrem® mikstur, et mellomstykke, en målesprøyte og to doseringsbegre med barnesikret lokk til tillaging og oppbevaring av to doser som tas om natten, og pakningsvedlegget for Xyrem®.




Figur 1.

Vær vennlig å lese pakningsvedlegget for viktig tilleggsinformasjon før du tar den første dosen med Xyrem®. Bruk alltid Xyrem® nøyaktig slik legen har fortalt deg.

Kontakt legen hvis du har ytterligere spørsmål eller bekymringer om Xyrem®.


Du må gjøre begge dosene klare før du legger deg.

1. Fjern flaskelokket ved å trykke ned mens du skrur lokket mot klokken (mot venstre). Etter å ha fjernet lokket settes flasken på en bordplate. Det er en plastbelagt folieforsegling på toppen av flasken som må fjernes før du bruker flasken første gang. Mens du holder flasken rett setter du inn mellomstykket i flaskehalsen. Dette behøver du bare å gjøre første gang flasken åpnes. Mellomstykket kan bli stående i flasken for senere bruk (se figur 2).




Figur 2.

2. Deretter settes spissen av målesprøyten inn i åpningen på flasken og trykkes hardt ned (se figur 3).



Figur 3.

- 3.** Mens du holder flasken og sprøyten med én hånd, trekker du opp den forskrevne dosen med den andre hånden ved å trekke i stemplet. **MERK:** Legemidlet vil ikke trekkes inn i sprøyten uten at du holder flasken rett (se figur 4).




Figur 4.

- 4.** Fjern sprøyten fra flaskeåpningen. Tøm legemidlet fra sprøyten over i et av doseringsbegrene ved å trykke ned stemplet. Gjenta dette trinnet for det andre doseringsbegeret. Tilsett deretter 60 ml vann i hvert doseringsbeger - 60 ml er omtrent 4 spiseskjeer (se figur 5).



Figur 5.

- 5.** Sett lokkene på doseringsbegrene og skru hvert lokk med klokken (til høyre) inntil det klikker og låser dem i en barnesikret posisjon (se figur 6). Skyll sprøyten med vann.



Figur 6.

- 6.** Like før du legger deg plasserer du den andre dosen i nærheten av sengen. Det kan være nødvendig å bruke en vekkeklokke slik at du våkner og kan ta den andre dosen, ikke tidligere enn 2,5 timer og ikke senere enn 4 timer etter den første dosen. Fjern lokket fra det første doseringsbegeret (se figur 7) ved å



trykke ned det barnesikrede lokket og skru lokket mot klokken (mot venstre). Drikk hele innholdet mens du sitter i sengen, sett på lokket igjen og legg deg ned med én gang.

Figur 7.

- 7.** Når du våkner 2,5 til 4 timer senere fjerner du lokket fra det andre doseringsbegeret. Mens du sitter i sengen drikker du hele den andre dosen rett før du legger deg ned for å fortsette å sove. Sett lokket tilbake på det andre doseringsbegeret. For flere detaljer om informasjonen i denne video-presentasjonen, vennligst les pakningsvedlegget i esken med Xyrem® og ta kontakt med lege eller apotek.

Denne informasjonen inngår i risikohåndteringsplanen (RMP) som anmodet om av de europeiske legemiddelmyndighetene



UCB Pharma A/S  
Grini Naeringspark, 8 B, N-1361 Oesteraas  
Tel: +47 67 16 5880  
info-ucbnordic@ucb.com