



XYREM
(sodium oxybate) oral solution

DU MÅ

- alltid ha med deg dette kortet.
- vise dette kortet til alle leger eller apotek som er involvert i behandlingen din.
- ha med deg en liste over alle legemidlene du bruker når du går til legen eller apoteket.
- informere legen umiddelbart dersom du får uvanlige symptomer mens du bruker Xyrem®.
- oppbevare Xyrem® utilgjengelig for barn.

Denne informasjonen er en del av risikohåndteringsplanen som kreves av Det europeiske legemiddelkontoret (EMA)

Dato for første forskrivning av Xyrem®: _____

KONTAKTINFORMASJON

Pasientens navn

Pasientens telefonnummer

Navn på pårørende

Pårørendes telefonnummer

Navn på behandlende lege

Legens telefonnummer

Kontaktnummer for akutt medisinsk hjelp

UCB Xyrem Pasientkort, v2.1 Desember 2014

Xyrem® (natriumoxybat)

**Viktig sikkerhetsinformasjon
for pasienter**

SOX-EDU-001018- 04-Dec-2014

XYREM
(sodium oxybate) oral solution

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR PASIENTER

Xyrem® kan gi nedsatt pustefunksjon og bevissthet.

Gjør **IKKE** noe av følgende:

- **IKKE** drikk alkohol når du bruker Xyrem®.
- **IKKE** ta mer enn den dosen legen har forskrevet.

- **IKKE** kjør bil eller bruk maskiner før etter at det er gått 6 timer etter at du har tatt Xyrem®.
- **IKKE** bruk andre legemidler med mindre du først har diskutert dette med legen.
- **IKKE** gi Xyrem® videre til andre.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FOR LEGER/APOTEK

Denne pasienten bruker Xyrem® til behandling av narkolepsi med katapleksi.

Xyrem® kan forårsake respirasjons- og CNS-depresjon, anfall, depresjon og selvmordsforsøk.

Opioider eller barbiturater skal ikke brukes sammen med Xyrem®. Andre respirasjons- og CNS-dempende legemidler bør unngås.

Vær spesielt forsiktig med å bruke topiramet og valproat sammen med Xyrem®.

Xyrem® har et misbruks- og avhengighetspotensial.

Vennligst se preparatomtalen for Xyrem® før forskrivning/utlevering av andre legemidler til denne pasienten.