

Her finner du noen spørsmål som du kanskje har om Xyrem®. Sørg for å kontakte helsepersonell hvis du har andre spørsmål, og les gjennom pakningsvedlegget som finnes i hver legemiddelpakning.


(sodium oxybate) oral solution



UCB Nordic A/S
Arne Jacobsens Allé 15
2300 København S
Telefon: +45 32 462 400



Ofte stilte spørsmål som pasienter kan ha om sikkerheten ved bruk av Xyrem® (natriumoksybat)

1

Hva er Xyrem®?

Xyrem® er en reseptpliktig mikstur som brukes til å behandle voksne som:

- hyppig faller i søvn på dagtid, og på uventede tidspunkt (narkolepsi);
- plutselig får svekkelse eller lammelse i muskler når de opplever sterke følelsesmessige reaksjoner (katapleksi)

2

Kan jeg drikke alkohol når jeg bruker Xyrem®?

Nei, du må ikke drikke alkohol når du bruker Xyrem®. Effektene av Xyrem® kan øke, og du kan få pusteproblemer (hemming av pustefunksjonen) som kan være livstruende. Du kan også oppleve tregere tankegang og forvirring.

3

Hvilke alvorlige bivirkninger har Xyrem®?

Pusteproblemer (hemming av pustefunksjonen)

Xyrem® kan påvirke pustefunksjonen. Hvis du har problemer med pusten eller lungene skal du informere legen om dette før du begynner å bruke Xyrem®. Hvis du er overvektig, er du også mer utsatt for hemming av pustefunksjonen. Du må ikke drikke alkohol, da dette også kan øke risikoen for hemming av pustefunksjonen. Hemming av pustefunksjonen kan være alvorlig og til og med dødelig.

Depresjon og selvmordstanker

Kontakt lege umiddelbart dersom du føler deg deprimert eller har tanker om å skade deg selv når du bruker Xyrem®. Hvis du tidligere har hatt depresjon, må du også informere legen om dette.

Nedsatt grad av bevissthet

Fordi Xyrem® virker direkte på hjernen, forårsaker det døsighet og kan gi nedsatt grad av bevissthet. Dette kan føre til koma og være livstruende. Det er viktig at du ikke drikker alkohol når du bruker Xyrem®. Du må ikke bruke andre legemidler som forårsaker døsighet. Du må heller ikke kjøre bil eller bruke maskiner før det har gått minst 6 timer etter at du har tatt Xyrem®.

Anfall

Xyrem® kan forårsake anfall. Hvis du tidligere har hatt anfall, må du informere legen om dette før du bruker Xyrem®.

Avhengighet/misbruk/feilbruk

Virkestoffet i Xyrem® er gammahydroksybutyrat (GHB). GHB er et kjemisk stoff som kan misbrukes og brukes på feil måte. Legen vil derfor spørre spesielt om du har misbrukt narkotika tidligere. Misbruk og feil bruk av Xyrem® er farlig og kan få livstruende konsekvenser.

Dette er ikke alle bivirkningene som kan oppstå ved bruk av Xyrem®. Rådfør deg med legen angående bivirkninger.

4

Er det trygt å bruke Xyrem® samtidig med andre legemidler?

Som for alle legemidler, er det svært viktig at du informerer legen om hvilke andre legemidler du bruker, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Xyrem® skal ikke brukes samtidig med legemidler som forårsaker døsighet eller samtidig med smertestillende legemidler klassifisert som narkotika og som demper aktiviteten i sentralnervesystemet. Sørg for at du informerer legen hvis du bruker legemidler som påvirker aktiviteten i sentralnervesystemet. Sørg for at du informerer legen hvis du bruker legemidler som påvirker aktiviteten i sentralnervesystemet (antidepressiver, valproat, topiramet, fenytoin eller etosuksimid).

Spør helsepersonellet om å få pasientkortet for Xyrem®, som er til å ha med seg og minne deg på hvordan Xyrem® skal brukes. Vis dette kortet til alle leger du går hos, slik at de vet at du bruker Xyrem®, spesielt hvis de også forskriver andre legemidler til deg.

5

Hva gjør jeg dersom jeg ved et uhell tar mer enn den dosen som er forskrevet?

Hvis du tar for mye av Xyrem® (overdose) skal du umiddelbart søke medisinsk hjelp.

Dersom du tar for mye av Xyrem® kan dette gi symptomer som uro, forvirring, nedsatt bevegelighet, nedsatt pustefunksjon, tåkesyn, kraftig svetting, hodepine, oppkast, nedsatt bevissthet som kan føre til koma og anfall.

Ta med deg den merkede flasken med legemidlet, selv om den er tom. Dette kan hjelpe helsepersonellet med å behandle symptomene dine.

6

Hva hvis jeg plutselig slutter å ta Xyrem®?

Dersom du plutselig slutter å ta Xyrem®, kan du få abstinenser. Du kan oppleve at katapleksianfallene kommer tilbake, og i sjeldne tilfeller kan du få søvnløshet, hodepine, angst, svimmelhet, søvnproblemer, søvnighet, hallusinasjoner og unormal tankegang.

7

Er det andre viktige ting jeg skal vite når jeg bruker Xyrem®?

- Ikke gi Xyrem® videre til andre.
- Bruk kun den dosen legen din har forskrevet.
Rådfør deg med legen dersom du tror dosen bør endres.
- Oppbevar alltid Xyrem® i originalpakningen, på et trygt sted.
- Oppbevar Xyrem® utilgjengelig for barn.
- Lever ubrukt legemiddel til apoteket.
- Kontakt legen dersom du får uvanlige symptomer når du bruker Xyrem® eller hvis du har noen spørsmål.