

Kontaktinformasjon til min lege:

Navn på lege

Telefonnummer i arbeidstiden

Telefonnummer utenfor arbeidstiden

Min kontaktinformasjon:

Mitt navn og telefonnummer

Navn og telefonnummer på omsorgsperson (i nødstilfelle)

VIKTIG informasjon til helsepersonell

- Denne pasienten er under behandling med YERVOY™
- Immunrelaterte bivirkninger (irARs) oppstår oftest i behandlingsfasen, men kan også oppstå måneder etter siste dose med YERVOY™
- Tidlig diagnose og egnet behandling er avgjørende for å minimere livstruende komplikasjoner. Spesifikke retningslinjer for håndtering av irARs med YERVOY™ er tilgjengelig.



- Hvis du ikke er spesialist i onkologi, vennligst ta kontakt med en spesialist.

Helsepersonell, se godkjent preparatomtale (SPC) for YERVOY™ på www.felleskatalogen.no eller www.ema.europa.eu eller kontakt Medisinsk informasjon på **23 12 06 37** for ytterligere informasjon.

YERVOY™ (ipilimumab)

Pasientkort

YERVOY™ (ipilimumab)

Dette kortet inneholder
viktig informasjon.

Ha alltid med deg dette
kortet, og vis det frem til alle
leger du trenger å kontakte
(for eksempel hvis din vanlige
lege er utilgjengelig eller hvis
du er på reise).

Det er viktig å gi beskjed
omgående til behandlende
lege hvis du får noen av
følgende symptomer eller
noen andre symptomer



MAGE OG TARM¹

- diaré (vandig, løs eller bløt avføring), blod i avføringen eller mørkere avføring
- økning i antall avføringer
- smerte eller ømhet i magen eller mageregionen, kvalme, oppkast

LEVER¹

- gulfarging av øyne eller hud (gulsott)
- smerte på høyre side av mageregionen
- mørk urin

HUD¹

- hudutslett med eller uten kløe, tørr hud
- blemmer og/eller hudavskalling, munnsår
- hovent ansikt eller hovne lymfeknuter

ØYE¹

- rødhet i øyet
- øyesmerter
- synsforandringer eller tåkesyn

NERVER¹

- muskelsvakhet
- nummenhet eller kribling i bein, armer eller ansikt
- svimmelhet, tap av bevissthet eller problemer med å våkne

GENERELLE LIDELSER¹

- feber, hodepine, tretthet
- blødning
- endret oppførsel (f.eks. redusert sexlyst, irritabilitet eller glemsomhet)



VIKTIG informasjon

- Rapporter nevnte symptomer til behandlende lege umiddelbart.
- Lette symptomer kan raskt forverres hvis de ikke behandles.¹
- Tidlig behandling av bivirkninger reduserer sannsynligheten for at YERVOY™-behandlingen må stoppes midlertidig eller permanent, og gjør at du får maksimalt utbytte av behandlingen.



VIKTIG informasjon

- Tegn og symptomer kan være forsinket og oppstå uker til måneder etter din siste injeksjon.¹
- Du skal ikke forsøke å behandle disse symptomene på egenhånd uten å konsultere behandlende lege først.
- Ha alltid med deg dette pasientkortet og vis det frem til ENHVER lege du oppsøker, og fortell at du behandles med YERVOY™.